

Cucurbitáceas

ZUCCHINI, ZAPALLO, CALABAZA, PEPINO, etc



Plantinera	Trasplante	Crecimiento	Floración	Crecimiento del Fruto		
------------	------------	-------------	-----------	-----------------------	--	--

cobrestable®	cobrestable®	cobrestable®	cobrestable®	cobrestable®	cobrestable®	cobrestable®
0,75% del volumen del caldo a aplicar	2,0 lts/ha	2,0 lt/ha	2,0 a 3,0 lt/ha	2,0 a 3,0 lt/ha	2,0 a 3,0 lt/ha	2,0 a 3,0 lt/ha
Aplicaciones Semanales	Inmediatamente post-trasplante	2 a 3 aplicaciones antes de floración cada 15 días		Aplicaciones cada 15 a 20 días hasta 30 días antes de cosecha		

Zucchini

Zapallo,
Calabaza

Pepino

- Nutrición;
- Promover un más temprano desarrollo radicular.
- Fortalecer tejidos para trasplante.

- Anti estrés;
- Rusticación de raíces.

- Estimulación del crecimiento foliar;
- Nutrición cúprica para fortalecer tejidos;
- Estimulación de síntesis de fitoalexinas;
- Fortalecimiento celular general para mejorar la vida en anaquel.