


Vid para Vinificar



Fundamentación Técnica de las Aplicaciones

- 1 2** Desde yema hinchada hasta prefloración. En los primeros estadios fenológicos los tejidos quedan expuestos constantemente al ataque de patógenos por el rápido crecimiento. **Enfoque Nutricional del manejo del cobre.** Aplicaciones de 3 lts/ha hasta post-cuaje para predisponer mejor a la planta en la defensa pasiva contra peronospora, botritis y oidio (aumento en la síntesis de lignina).
- 3** Floración hasta post-cuaje 3 lts/ha de. **Enfoque Nutricional del manejo del cobre.** Aplicaciones para potenciar liberación de polen, cuaje y fortalecimiento de los meristemas en activo crecimiento de la etapa inicial del crecimiento de las bayas. Defensa pasiva. Aumento de las barreras contra el ingreso de patógenos peronospora, botritis y oidio (aumento en la síntesis de lignina).
- 4** Aplicaciones tradicionales de cobre preventivas para Peronospora. Se repiten de acuerdo a condiciones predisponentes.
- 5** Aplicación de post-cosecha para el fortalecimiento de yemas con cobre. Objetivo: uniformar la brotación siguiente y disminuir el potencial de inóculo de patógenos fúngicos.