


# Vid para Vinificar



## Fundamentación Técnica de las Aplicaciones

- 1 Desde yema hinchada hasta prefloración. En los primeros estadios fenológicos los tejidos quedan expuestos constantemente al ataque de patógenos por el rápido crecimiento.
- 2 **Enfoque Nutricional del manejo del cobre.** Aplicaciones a bajas dosis de **Cobrestable** (2 lts/ha) hasta post-cuaje para predisponer mejor a la planta en la defensa pasiva contra peronospora, botritis y oidio (aumento en la síntesis de lignina).
- 3 Floración hasta post-cuaje 2-3 lts/ha de **Cobrestable**. **Enfoque Nutricional del manejo del cobre.** Aplicaciones para potenciar liberación de polen, cuaje y fortalecimiento de los meristemas en activo crecimiento de la etapa inicial del crecimiento de las bayas. Defensa pasiva. Aumento de las barreras contra el ingreso de patógenos peronospora, botritis y oidio (aumento en la síntesis de lignina).
- 4
- 5 Aplicaciones específicas como **Fungicida** para el control de peronospora con Bordocald. Con condiciones predisponentes intensas, aplicar la dosis mayor (5 kg/ha).
- 6
- 7 Aplicación de pre-cosecha (5 a 7 días antes) de **Cobrestable**. El objetivo es aumentar los tenores de nitrógeno amoniacal de las bayas para **favorecer los procesos de fermentación**. La aplicación de cobre en este etapa también colabora en el proceso de fermentación y contra la formación de malos olores en el vino.